

2020년 1월 16일 배포 시부터 보도하여 주시기 바랍니다.

환경부 야생조류 AI 대응상황반 팀장 장성현(044-201-7245), 사무관 김태윤(7257)

농식품부 AI 국내방역반 반장 이기중(044-201-2551), 서기관 황성철(2555) / 제공일 1월 16일(총 5매)

걱정없이 농사짓고 안심하고 소비하는 나라

지난 일주일 간(1.8~1.14) 창원, 고양, 구미, 원주 등 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자 14건 확진

- 농림축산식품부(장관 김현수)와 환경부(장관 조명래)는 야생조류 조류인플루엔자 예찰 과정에서 수거·채취한 야생조류 폐사체, 분변 및 포획개체를 검사한 결과, 지난 일주일 간(1월8일~14일) H5N8형 고병원성 조류인플루엔자(AI) 14건이 확진됐다고 밝혔다.

※ 야생조류 H5N8형 고병원성 조류인플루엔자 누적건수 : 74건 (2020년 10월 1일 이후)

구분	장소	수거·채취일	확진일
폐사체 (10)	큰기러기	경남 창원시 주남저수지	1월 3일
	큰고니	경남 창원시 주남저수지	1월 3일
	큰기러기	경기 고양시 벽제천	1월 4일
	쇠기러기	경기 고양시 오금천	1월 4일
	큰고니	경북 구미시 지산샛강	1월 5일
	알락오리	제주 서귀포시 오조리	1월 5일
	대백로	경기 오산시 오산천	1월 6일
	쇠기러기	경기 고양시 장항습지	1월 6일
	큰고니	충북 충주시 달천	1월 6일
	쇠기러기	경기 화성시 화성호	1월 6일
분변(3)	미정	강원 원주시 원주천	1월 5일
	미정	경기 포천시 포천천	1월 6일
	미정	부산 사하구 을숙도	1월 7일
포획(1)	흰뺨검둥오리	충남 부여군 금천	1월 6일

- 최근 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 지속적으로 검출되고 있으며, 고병원성 조류인플루엔자가 심각했던 ‘16/17년 동절기와 비교했을 때도 야생조류에서 검출건수가 대폭 증가*한 상황이다.

* (1월 1주 차까지) ‘16/17년 동절기 41건, ‘20/21년 동절기 74건

- 농림축산식품부와 환경부는 이번에 확진된 지역을 포함하여 야생조류 고병원성 조류인플루엔자 검출지역에 대한 예찰과 사람·차량 출입 통제를 강화하고,

- 농장 내 고병원성 조류인플루엔자 유입 방지를 위해 철새도래지 주변 도로, 농장 진입로 등은 광역방제기와 방역차량 등 소독 자원*을 총 동원하여 집중 소독을 실시하고 있다.

* 광역방제기, 방역차량, 공동방제단, 살수차, 드론, 군제독차, 농협방역지원단 등

- 이기중 농식품부 조류인플루엔자방역과장(국내방역반 반장)은 “전국 곳곳 야생조류에서 고병원성 AI 항원이 지속 검출되고 있어 가금농장 추가 발생이 우려되는 매우 엄중한 상황”으로

- “가금농장은 외부 사람·차량의 출입을 최대한 금지하고, 축사 진입 전 장화 갈아신기, 생석회 벨트 구축, 전실 청소·소독 등 차단방역에 최선을 다할 것”을 당부하였다.

- 또한, 장성현 환경부 야생조류 AI 대응상황반 팀장은 “올 겨울은 조류인플루엔자 확산 예방을 위해 가급적 철새서식지 방문을 자제하고, 부득이하게 방문시 소독 및 마스크 착용 등 개인 위생을 철저히 해줄 것과 야생조류 폐사체 발견 시 접촉을 피하고 당국에 즉시 신고해줄 것”을 강조하였다.

참고1

야생조류 조류인플루엔자 국민대응수칙

조류인플루엔자(AI) Q&A

Q1 조류인플루엔자(AI)는 어떤 질병인가요?

조류인플루엔자(Avian Influenza) 바이러스 감염에 의하여 닭, 오리 철새 등 여러 종류의 조류에 전염되는 호흡기 질병

Q2 바이러스의 생존력은 어느 정도인가요?

분변에 오염된 AI는 4℃에서 35일간 생존, 호수 등 물에서는 22℃에서 4일간, 0℃에서 30일간 생존

※ 가금육은 75℃에서 5분간 가열시 바이러스 사멸

Q3 바이러스의 주요 전파 경로는?

바이러스에 오염된 토양, 물, 분변 등을 신발, 의복, 차량바퀴 등으로 직접 접촉하는 것이 주된 전파 경로

Q4 바이러스 감염 증상은 어떤가요?

AI 감염 조류는 무증상 돌연사, 설사, 구토, 쇠약, 행동이상(머리 기울임, 머리·목 비틀기), 보행이상(기립 및 날개짓 불능) 등을 보임

조류AI 신고요령

이럴때 신고하세요

- 하천 등지에서 야생조류 폐사체 발견 시
- 이상행동을 보이는 야생조류 발견 시
- ※ 감염이 의심되는 조류 발견 시 접촉하지 말고 즉시 신고




여기에 신고하세요

- 시·군·구 환경과
- 유역(지방) 환경청 자연환경과
- 국립야생동물질병관리원 (062-949-4371/4321)



야생조류 조류인플루엔자(AI) 국민 대응 수칙

조류인플루엔자(AI) 확산 방지를 위해
다음 국민 행동요령을 지켜 주시기 바랍니다.



국민행동 기본원칙



시 발생으로 인한 '출입통제' 지역 출입 금지

불가피하게 시 발생지역 방문시



여벌의 활동복, 신발, 신발커버, 모자 등 준비
활동 후 탈의 및 비닐로 밀봉

※ 일회용 보호복(방역복 등) 착용 권장(일회용 물품 폐기, 나머지 세척)

시 발생지역을 다녀온 후



철새서식지에서 벗어날 시 신발세척·소독 및
물과 비누로 손씻기 등 개인위생 철저

※ 발열 등 인플루엔자 의심 증상 발생 시 관할지역 보건소에 즉시 신고



저수지, 하천 등 철새가 무리 지어 있는 지역 및
시 발생지역에서 낚시 금지



이동시에는 분변, 깃털 등을 밟지 않도록 주의

※ 분변에 노출 된 경우 즉시 비누와 물로 세정



철새서식지 출입 후 가금(닭, 오리 등)농가 방문 금지 및
관련 종사자(농가 종사자, 사료-분뇨 운반자 등) 접촉 금지

조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 주변 생석회 벨트 구축



농장 진입로 폭 2m 이상·주변 50cm 이상
바닥이 보이지 않을 만큼 충분히 도포

- 1주일 간격 반복 도포, 비·눈 내린 후 즉시 재도포
- 도포된 생석회 위에 산성 소독제 살포 금지

2단계 농장 내부 매일 청소·소독




※ 소독약은 용법용량의 권장 희석배수 준수

- 농장 내부, 사료빈·퇴비사·출하대 주변 매일 청소·소독
- 야생조수류 유인 요소(사료·폐사축·왕겨 등) 방치 금지

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

세척솔·물(세척조)를 이용하여
장화에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 지정된 관리자 외 축사 출입 최대한 통제
- 축사 출입시 손 소독, 방역복·위생장갑·전용장화 착용

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 청소·소독 순서

- ① 청소·세척 천장→벽→바닥 순
- ② 건조
- ③ 소독약 살포
천장→벽→바닥 순



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부