고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부	**보도자료**	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 12월 27일 배포 시부터 보도하여 주시기 바랍니다.

농림축산식품부 AI 종합상황반 반장 이동식(044-201-2511), 사무관 조수영(2517)
농림축산식품부 AI 국내방역반 반장 홍기성(044-201-2551), 사무관 김석재(2555), 사무관 이재승(2526)
환경부 생물다양성과 과장 박소영(044-201-7245), 사무관 이정원(7259) / 제공일: 12월 27일(총 2매)

걱정없이 농사짓고 안심하고 소비하는 나라

전북 부안 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심축 발생

□ 고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 김현수 농식품부 장관, 이하 중수본)는 **오늘 전북 부안 종오리 농장**[18차(잠정)](약 10천수 사육)에서 고병원성 조류인플루엔자 **의심축**이 확인되었다고 밝혔다.

* **(가금농장발생) 17건**(11.8.~, 산란계6, 육계2, 오리8, 메추리1/ 충북4, 충남3, 세종2, 전남8)

○ 의심축이 확인된 즉시 **초동대응팀**을 **현장에 투입**하여 해당 농장에 대한 **출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사** 등 **선제적 방역조치**를 실시하고 있다.

* 반경 1km 이내 가금농가는 없으며, 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정

□ 중수본은 "**소독·방역시설이 설치되지 않은 부출입구·뒷문 폐쇄**와 함께 **외부울타리, 차량소독시설** 등 **방역시설**이 적정한지 꼼꼼히 점검하고"

○ "사육가금에서 **폐사 증가, 산란율·사료섭취량·활동성 저하** 등 **의심증상**을 **면밀히 관찰**하여 **이상**이 있을 경우 **즉시 방역당국**으로 **신고**할 것"을 당부하였다.

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

참고	농장 4단계 소독 요령

조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방

「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상
생석회 충분히 도포



- **1주일** 간격 **반복** 도포
- **비·눈 내린 후** 즉시 재도포

출입구 고정식+고압분무기
2단계 소독



- **U자형 소독시설**인 경우 **고압분무기**로 차량의 바퀴와 하부 등 **추가 소독**

2단계 농장 내부 관리 철저


농장 내부(축사 밖)
매일 청소·소독



※ 소독약은 용법용량 권장 희석배수 준수

- 농장 내 **야생조수류 유인 요소**(사료·폐사축·왕겨) **매일 청소·소독**

부출입구·뒷문 폐쇄



- 전실 미설치 **축사 뒷문(쪽문) 폐쇄**
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 **농장 부출입구 폐쇄**

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 **전용장화 · 손소독제** 비치·전실 **매일 소독**
- 신발(장화)에 붙은 **유기물 제거 후 신발소독조 사용**
- **장화 갈아신기용 구조물** 또는 **발판** 설치

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 **직접적인** 소독제 **분사 금지**
- 가축과 직접 접촉하는 **물품소독 철저 및 외부 반출 금지**

농장에서의 **철저한 방역수칙 준수**만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

농림축산식품부 농림축산검역본부 가축위생방역지원본부